

הנחיות לשימוש

מיטרום אבקה – תוסף מזון המרחיק קרדיות מהלול

מטרת השימוש

- טיפול בבעיית קרדית אדומה במטילות .
- הפחתה בתסמיני ניקור ותמותה כתוצאה מקרדיות בלולי הטלה.
- הגדלת אחוז ההטלה עקב הגבלת אוכלוסית הקרדית בלולים.
- טיפול בבעיית לכלוך ביצים כתוצאה מקרדית.

מתי להשתמש

- משקים מסחריים הסובלים מנגיעות בקרדית אדומה.
- משקים מסחריים מתחילת אכלוס הלול לשימוש מניעת לקרדית אדומה.

הוראות השימוש במקרה של נגיעות בקרדית:

- מינון: 1 ק"ג מיטרום לכל טון תערובת.
- משך הטיפול: במשך 6 עד 10 שבועות ברציפות.
- שלב הייצוב: להמשיך עם 1 ק"ג מיטרום לטון תערובת.
- משך הטיפול: שבוע אחד בחודש עד לסיום המדגר.
-

הוראות השימוש במקרה של נגיעות גבוהה:

- מינון: 4 שבועות הראשונים ברציפות 2 ק"ג מיטרום לכל טון תערובת.
- מינון: 4 שבועות הבאים ברציפות 1 ק"ג מיטרום לכל טון תערובת.
- שלב הייצוב: להמשיך 1 ק"ג מיטרום לכל 1 טון תערובת במשך שבוע אחד בחודש עד לסיום המדגר.

יתרונות השימוש במיטרום:

- המיטרום הינו חומר על בסיס טבעי המונע מקרדיות להיטפל לעופות.
- ללא תופעות לווי .
- ניתן לשימוש עם חומרים אחרים.
- ללא צורך הריסוסים או טיפולים משלימים.
- שומר על בריאות העוף.
- משפר הטלה .
- מפחית לכלוך ביצים.
- מעלה את איכות הביצים.

תוצאה צפויה לאחר ארבעה שבועות שימוש:

- הפחתה משמעותית של נגיעות הלול בקרדית אדומה
- הקרדית, אם תימצא בלול, תהפוך לאפורה ותתרחק מהעופות